КОНФЛИКТЫ С ПОДРОСТКАМИ

Консультация для родителей и законных представителей воспитанников

Это очень важная информация для родителей. Маркеры опасности — это признаки, которые указывают на то, что подросток может находиться в состоянии острого кризиса и ему требуется немедленная помощь. Эти признаки говорят о высоком риске саморазрушающего поведения, включая суицид.

Вот список таких маркеров, составленный максимально четко.

Критические маркеры опасности (требуют немедленной реакции) **Это** «красные флаги», игнорировать которые нельзя ни в коем случае.

- 1. Прямые или косвенные высказывания о нежелании жить.
- · Прямые: «Я хочу умереть», «Я не хочу больше жить», «Скоро это все закончится».
- · Косвенные: «Вам без меня будет лучше», «Я обуза для всех», «Скоро отдохну очень надолго», «Больше вы меня мучить не будете».
- 2. Приведение дел в порядок.
 - · Раздача ценных вещей друзьям и родственникам («на память»).
- · Внезапные попытки помириться с давними врагами или написать прощальные письма.
- · Необъяснимое «наведение порядка» в комнате, на компьютере, в социальных сетях.
- 3. Приобретение средств для совершения сущида.
- · Попытки раздобыть таблетки, веревку, оружие и т.д. Это самый грозный признак.
- 4. Самоизоляция и прощание.
- · Полный уход от контактов: прекращение любых коммуникаций даже с самыми близкими друзьями.
- · Прощальные намёки в соцсетях, мессенджерах (посты, сторис, статусы с намёком на прощание).
- 5. Резкое, необъяснимое улучшение настроения после длительной подавленности.
- Это очень коварный признак! Родственникам может показаться, что кризис миновал. На самом деле, такое спокойствие может означать, что мучительное решение уже принято, и внутренняя борьба закончилась.
- 6. Физическое самоповреждение (селфхарм) с опасными для жизни последствиями.
 - · Глубокие порезы, ожоги, особенно в области запястий, бедер, шеи.
- · Любые действия, требующие последующей медицинской помощи (сильное кровотечение, отравление).

Эти признаки сигнализируют, что подросток в глубоком кризисе, и риск перехода к опасным действиям очень высок.

- 1. Выраженная и продолжительная депрессия.
- · Ангедония полная утрата способности получать удовольствие от чего бы то ни было.
 - Двигательная заторможенность или, наоборот, сильное возбуждение.
 - · Стойкое нарушение сна и аппетита (потеря или резкое увеличение веса).
- 2. Резкая социальная изоляция.
- · Полный разрыв всех социальных связей, уход в себя, отказ выходить из комнаты.
- 3. Острая реакция на стресс.
 - Попытка суицида или самоповреждения в прошлом.
- · Недавняя тяжелая утрата: смерть близкого, развод родителей, расставание с парнем/девушкой, особенно если подросток остался с этим один на один.
 - Пережитое насилие (физическое, сексуальное, психологическое).
- 4. Употребление психоактивных веществ (ПАВ).
- · Алкоголь и наркотики снижают контроль над побуждениями и могут подтолкнуть к роковому шагу.
- 5. Агрессивное и импульсивное поведение.
- · Вспышки ярости, истерики, участие в драках, опасное вождение. Это может быть признаком невыносимой внутренней боли.
- 6. Чувство безнадежности и безисходности (нахождение «в ловушке»).
- · Убежденность, что ситуация никогда не улучшится, и выхода нет. Фразы: «Отстань, ничего уже не изменить», «Это бесполезно».

Что делать родителям, если они заметили маркеры опасности?

- 1. НЕ ОСТАВЛЯТЬ ОДНОГО НИ НА МИНУТУ. Если есть прямой намёк на суицид или его подготовку обеспечьте постоянное присутствие кого-то из взрослых.
- 2. ГОВОРИТЬ ПРЯМО И ОТКРЫТО.
- · Задайте прямой вопрос: «Ты думаешь о том, чтобы навредить себе или покончить с жизнью?»
- · Миф: «Если спросить, то можно подкинуть ему эту идею». Правда: Открытый разговор снижает тревогу и дает подростку шанс выговориться и попросить о помощи.
- 3. ВЫРАЗИТЬ ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ.
- · «Я не до конца понимаю, что ты чувствуешь, но я вижу, как тебе тяжело. Я люблю тебя и мы справимся с этим вместе».
- 4. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ.

5. УБРАТЬ ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: Из дома необходимо убрать лекарства, острые предметы, оружие и т.д.

Главное: Не пытайтесь справиться с этой ситуацией в одиночку и не надейтесь, что «само пройдет». Промедление может стоить жизни. Обращение к психиатру в такой ситуации — это не клеймо, а акт спасения.

Берегите своих детей. Ваша внимательность и своевременная реакция — самый важный фактор защиты.